

歯科口腔外科

適応	レジメン名	抗がん剤一般名	用量	用法	時間	投与日	1クール
頭頸部癌	cetuximab+CF初回導入	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	21日
		セツキシマブ	250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 8・15	
		シスプラチン(CDDP)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	1000mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-4	
頭頸部癌	cetuximab+CF継続投与	セツキシマブ	250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1・8・15	21日
		シスプラチン(CDDP)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	1000mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-4	
頭頸部癌	GDDP+RT	シスプラチン(CDDP)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1・22・43	64日
頭頸部癌	CAP	シスプラチン(CDDP)	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	21日
		シクロホスファミド(CPA)	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1	
		ドキシルビシン(DXR)	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1	
頭頸部癌	セツキシマブ+パクリタキセル初回導入	セツキシマブ	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	7日
		パクリタキセル(PTX)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1	
頭頸部癌	セツキシマブ+パクリタキセル継続投与	セツキシマブ	250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1	7日
		パクリタキセル(PTX)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1	
頭頸部悪性黒色腫	CP療法	パクリタキセル(PTX)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1・8・15	28日
		カルボプラチン(CBDCA)	2(AUC)	点滴静注	1時間	day 1・8・15	