

## 泌尿器科

| 適応    | レジメン名          | 抗がん剤一般名           | 用量                    | 用法   | 時間  | 投与日         | 1クール |
|-------|----------------|-------------------|-----------------------|------|-----|-------------|------|
| 前立腺癌  | DTX            | ドセタキセル(DTX)       | 75mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 1時間 | day 1       | 21日  |
| 前立腺癌  | カバジタキセル        | カバジタキセル           | 25mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 1時間 | day 1       | 21日  |
|       |                | プレドニゾン            | 10mg/日                | 内服   |     | day 1-21    |      |
| 尿路上皮癌 | GDC            | ドセタキセル(DTX)       | 60mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 1時間 | day 1       | 21日  |
|       |                | ゲムシタビン(GEM)       | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分 | day 1・8     |      |
|       |                | シスプラチン(CDDP)      | 70mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 5時間 | day 2       |      |
| 尿路上皮癌 | GDCarbo        | ドセタキセル(DTX)       | 60mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 1時間 | day 1       | 21日  |
|       |                | ゲムシタビン(GEM)       | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分 | day 1・8     |      |
|       |                | カルボプラチン(CBDCA)    | 5(AUC)                | 点滴静注 | 2時間 | day 2       |      |
| 尿路上皮癌 | GC(インターバル21日間) | ゲムシタビン(GEM)       | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分 | day 1・8     | 21日  |
|       |                | シスプラチン(CDDP)      | 70mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 2時間 | day 2       |      |
| 尿路上皮癌 | GC(インターバル28日間) | ゲムシタビン(GEM)       | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分 | day 1・8・15  | 28日  |
|       |                | シスプラチン(CDDP)      | 70mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 2時間 | day 2       |      |
| 尿路上皮癌 | 入院GCarbo       | ゲムシタビン(GEM)       | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分 | day 1・8・15  | 28日  |
|       |                | カルボプラチン(CBDCA)    | 5(AUC)                | 点滴静注 | 2時間 | day 2       |      |
| 尿路上皮癌 | 外来GCarbo       | ゲムシタビン(GEM)       | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分 | day 1       | 21日  |
|       |                | カルボプラチン(CBDCA)    | 3(AUC)                | 点滴静注 | 2時間 | day 1       |      |
| 尿路上皮癌 | GDF            | ドセタキセル(DTX)       | 60mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 1時間 | day 1       | 14日  |
|       |                | ゲムシタビン(GEM)       | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 30分 | day 1       |      |
|       |                | ドキシフルリジン(5'-DFUR) | 1日1200mg              | 内服   |     | day 1-5     |      |
| 尿路上皮癌 | M-VAC          | メトトレキサート(MTX)     | 30mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 30分 | day 1・15・22 | 28日  |
|       |                | ビンブラステチン(VLB)     | 3mg/m <sup>2</sup>    | 点滴静注 | 30分 | day 2・15・22 |      |
|       |                | ドキシソルビシン(DXR)     | 30mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 30分 | day 2       |      |
|       |                | シスプラチン(CDDP)      | 70mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 4時間 | day 2       |      |
| 精巣腫瘍  | BEP            | プレオマイシン(BLM)      | 30mg                  | 点滴静注 | 30分 | day 2・9・16  | 21日  |
|       |                | エトポシド(ETP)        | 100mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | 2時間 | day 1-5     |      |
|       |                | シスプラチン(CDDP)      | 20mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 2時間 | day 1-5     |      |
| 精巣腫瘍  | EP             | エトポシド(ETP)        | 100mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | 2時間 | day 1-5     | 21日  |
|       |                | シスプラチン(CDDP)      | 20mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 2時間 | day 1-5     |      |
| 精巣腫瘍  | TIP            | パクリタキセル(PTX)      | 200mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | 3時間 | day 1       | 21日  |
|       |                | シスプラチン(CDDP)      | 20mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 2時間 | day 2-6     |      |
|       |                | イホスファミド(IFM)      | 1.2g/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 2時間 | day 2-6     |      |
| 腎細胞癌  | トーリセル          | テムシロリムス(TML)      | 25mg                  | 点滴静注 | 1時間 | day 1       | 7日   |