

第三内科

適応	レジメン名	抗がん剤一般名	用量	用法	時間	投与日	1クール
膵臓癌	GEM	ゲムシタピン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day 1・8・15	28日
膵臓癌	FOLFIRINOX	オキサリプラチン(L-OHP)	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	14日
		レボホリナート(L-LV)	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	
		イリノテカン(CPT-11)	180mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	300ml/h	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	46時間	day 1	
膵臓癌	nab-PTX+ゲムシタピン(q4w)	アルブミン懸濁型パクリタキセル(nab-PTX)	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day 1・8・15	28日
		ゲムシタピン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day 1・8・15	
胆道癌	GEM	ゲムシタピン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day 1・8・15	28日
胆道癌	GC(GEM+CDDP)	ゲムシタピン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day 1・8	21日
		シスプラチン(CDDP)	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1・8	
肝細胞癌	ミリプラチン療法	ミリプラチン	70~120mg	動脈注射		day 1	
肝細胞癌	肝動注CDDP(アイエーコール)	シスプラチン(CDDP)	50mg/m <sup>2</sup>	動脈注射		day 1	
肝細胞癌	エピルピシジン	エピルピシジン(EPI)	40mg	動脈注射		day 1	
肝細胞癌	マイトマイシン	マイトマイシンC(MMC)	8mg	動脈注射		day 1	
肝細胞癌	New FP(初回導入)	シスプラチン(CDDP)	50mg	動脈注射		day 1・8	14日
		フルオロウラシル(5-FU)	250mg	動脈注射		day 1・8	
		フルオロウラシル(5-FU)	1250mg	動脈注射	0.4ml/h	day 1・8	
肝細胞癌	New FP(継続投与)	シスプラチン(CDDP)	20mg	動脈注射		day 1	14日
		フルオロウラシル(5-FU)	500mg	動脈注射		day 1	
食道癌	Weekly Paclitaxel	パクリタキセル(PTX)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1・8・15・22・29・36	49日
食道癌	FP	シスプラチン(CDDP)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	21日
		フルオロウラシル(5-FU)	800mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-5	
胃癌	CPT-11単剤療法	イリノテカン(CPT-11)	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	day 1・15	28日
胃癌	CDDP+5FU+ハーセプチン(初回)	トラスツズマブ	8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	21日
		シスプラチン(CDDP)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	800mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-5	
胃癌	CDDP+5FU+ハーセプチン(継続)	トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	21日
		シスプラチン(CDDP)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	800mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-5	
神経内分泌細胞癌	CBDCA+VP-16	エトポシド(ETP)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1-3	21日
		カルボプラチン(CBDCA)	5(AUC)	点滴静注	1時間	day 1	