

耳鼻咽喉科

適応	レジメン名	抗がん剤一般名	用量	用法	時間	投与日	1クール
頭頸部癌	TC	パクリタキセル(PTX)	175mg/m ²	点滴静注	3時間	day 1	21日
		カルボプラチン(CBDCA)	5.5(AUC)	点滴静注	2時間	day 1	
頭頸部癌	CF	シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	21日
		フルオロウラシル(5-FU)	800mg/m ²	持続静注	24時間	day 1-5	
頭頸部癌	CF+RT	シスプラチン(CDDP)	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	28日
		フルオロウラシル(5-FU)	600mg/m ²	持続静注	24時間	day 1-5	
頭頸部癌	TPF	ドセタキセル(DTX)	60mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	21日
		フルオロウラシル(5-FU)	750mg/m ²	持続静注	24時間	day 1-5	
		シスプラチン(CDDP)	70mg/m ²	点滴静注	2時間	day 4	
頭頸部癌	cetuximab+CF初回導入	セツキシマブ	400mg/m ²	点滴静注	2時間	day 3	21日
		セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	1時間	day 10・17	
		シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	800mg/m ²	持続静注	24時間	day 1-5	
頭頸部癌	cetuximab+CF継続投与	セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	1時間	day 3・10・17	21日
		シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	
		フルオロウラシル(5-FU)	800mg/m ²	持続静注	24時間	day 1-5	
頭頸部癌	cetuximab初回導入	セツキシマブ	400mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	7日
頭頸部癌	cetuximab継続投与	セツキシマブ	250mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	7日
頭頸部癌	monthly DTX	ドセタキセル(DTX)	60mg/m ²	点滴静注	1時間	day 1	21日
頭頸部癌	頭頸部癌術後CDDP療法	シスプラチン(CDDP)	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	21日
悪性黒色腫	DAV療法	ダカルバジン(DTIC)	100mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1-5	28日
		ニムスチン(ACNU)	50mg/m ²	静脈注射		day 1	
		ビンクリスチン(VCR)	0.5mg/m ²	静脈注射		day 1	
悪性黒色腫	DAC-tam療法	シスプラチン(CDDP)	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day 1	28日
		ダカルバジン(DTIC)	160mg/m ²	点滴静注	30分	day 2-5	
		ニムスチン(ACNU)	60mg/m ²	点滴静注	30分	day 2	
		タモキシフェン(TAM)	1日20mg	内服		day 1-28	
悪性黒色腫	オブジーボ	ニボルマブ	2mg/kg	点滴静注	1時間	day 1	21日