

## 皮膚科・形成外科

適応	レジメン名	抗がん剤一般名	用量	用法	時間	投与日	1クール
悪性黒色腫	DAV-Feron	ダカルバジン(DTIC)	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1-5	28日
		ニムスチン(ACNU)	50mg/m <sup>2</sup>	静脈注射		day 1	
		ビンクリスチン(VCR)	0.5mg/m <sup>2</sup>	静脈注射		day 1	
		インターフェロンβ(IFN-β)	300万U	局注		day 1-5	
悪性黒色腫	DAC-tam療法	シスプラチン(CDDP)	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	4時間	day 1-3	28日
		ダカルバジン(DTIC)	220mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1-3	
		ニムスチン(ACNU)	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1	
		タモキシフェン(TAM)	1日20mg	内服		day 1-28	
血管肉腫	weeklyドセタキセル	ドセタキセル(DTX)	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1・8・15	28日
血管肉腫	アドリアシン単独療法	ドキソルピシン(DXR)	0.6mg/kg	静脈注射		day 1-3	21日
血管肉腫	パクリタキセル	パクリタキセル(PTX)	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1・8・15・22・29・36	56日
頭頸部癌	tri-weeklyドセタキセル (頭頸部)	ドセタキセル(DTX)	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day 1	21日
皮膚上皮性悪性腫瘍	Low dose FP療法	シスプラチン(CDDP)	5mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1-5	21日
		フルオロウラシル(5-FU)	500mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-7	